

Kuřáctví na 2. LF UK v Praze z pohledu GHPS
– *Global Health Professional Survey*
The Smoking Habit at the Charles University, 2nd Faculty
of Medicine in Prague from the Point of View of GHPS
– *Global Health Professional Survey*

Dohnal K

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, 2. LF UK, Praha

Za současného vývoje kuřáctví zemře ve světě během příštích padesáti let téměř půl miliardy lidí na následky užívání tabáku. Jednou ze strategií vedoucích ke snížení počtu onemocnění a úmrtí v důsledku kouření je zvýšit zapojení zdravotnických pracovníků do prevence a léčby kuřácké závislosti.

Mezi lety 2005 a 2008 bude prostřednictvím studie GHPS zmapováno všech 192 členských zemí WHO. Projekt sleduje údaje o prevalenci a okolnostech kouření cigaret a dalších tabákových výrobků, znalosti a postoje ke kouření, postavení zdravotnických pracovníků v systému poskytování léčby kuřácké závislosti a výukou odvykacích metod.

Tato studie přináší nepříznivé údaje o prevalenci kouření mezi budoucími zdravotnickými pracovníky, ve většině sledovaných zemí je prevalence vyšší než 20 %. Obdobná situace je i na 2. LF UK a to vyžaduje přijmout taková opatření, která by tento nepříznivý stav upravila. Být nekuřáckým vzorem by mělo patřit k samozřejmým povinnostem všech zdravotnických pracovníků.