

Kvalita života související s orálním zdravím

The Quality of Life Connected with Oral Health

Hodačová L¹, Šmejkalová J², Čermáková E³, Slezák R⁴

¹Ústav sociálního lékařství,

²Ústav hygieny a preventivního lékařství,

³Oddělení výpočetní techniky a

⁴Stomatologická klinika, LF UK v Hradci Králové

Průřezová studie hodnotí dopad orálního zdraví na kvalitu života u vzorku české populace. Za metodu sledování byla použita česká verze dotazníku OHIP-14 (Oral Health Impact Profile; Profil dopadu orálního zdraví). Studie byla provedena v souboru 640 jedinců (322 mužů, 318 žen) ve věkovém rozmezí 30–69 let. Statistická analýza byla provedena pomocí χ^2 testu, Mannova-Whitneyova a Kruskalova-Wallisova ANOVA testu. Míra spolehlivosti české verze dotazníku byla velmi vysoká (Cronbachovo $\alpha = 0,92$). Nejčastěji udávaný dopad orálního zdraví na vnímanou kvalitu života (odpovědi častěji a velmi často během posledních 12 měsíců) byl u položky č. 4 – problémy s ukusováním a/nebo se žvýkáním (9,5 %) a položky č. 3 – bolestivý pocit v ústech (8,9 %). Znalost přesných údajů ohledně přítomnosti či absence nemoci stejně jako informace o vnímání zdravotního stavu samotným pacientem jsou nezbytné pro tvorbu programů podpory zdraví a prevence nemocí, stejně jako pro otázky související s rozdělováním zdrojů ve zdravotnictví.

Práce vznikla v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NR 8781-3/2006.