

Balónková perkutánní transluminální angioplastika (PTA) – Vliv na kvalitu života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK): Výsledky prospektivní analýzy

Blower Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) – Influence on the Quality of Life in Patients Suffering from Lower Extremity Ischemic Disease: Results of a Prospective Analysis

Slováček L¹, Slováčková B², Pavlík V³, Chovanec V⁴

¹*Katedra válečného vnitřního lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové*

²*Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové*

³*Katedra vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové*

⁴*Radiologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové*

Prospektivní longitudinální studie hodnotí vliv PTA na kvalitu života nemocných s ICHDK. Data byla získána v průběhu roku 2006 od 30 respondentů hospitalizovaných na OKH II. interní kliniky FN Hradec Králové (20 mužů, 10 žen). Všichni respondenti měli postižení femoro-popliteálního arteriálního řečiště. Jejich průměrný věk byl 63,1 roku (věkové rozmezí 49–79 let). Průměrný časový interval od provedení PTA byl 3,8 měsíce (rozmezí 3–6 měsíců). Hodnocení kvality života bylo provedeno českou verzí mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D.