

Vliv vybraných zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života nemocných s mnohočetným myelomem (MM) a maligním lymfomem (ML) po transplantaci krvetvorných buněk (TKB)

The Influence of Selected Health and Psycho-Social Aspects on the Quality of Life in Patients Suffering from Multiple Myeloma (MM) and Malignant Lymphoma (ML) Following Erythropoietic Cell Transplantation

Slováček L¹, Slováčková B², Jebavý L^{1,3}, Pavlík V⁴,
Blažek M³, Horáček JM^{1,3}

¹Katedra válečného vnitřního lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

²Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové

³Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové

⁴Katedra vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Transverzální, retrospektivní studie analyzuje vliv vybraných zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života nemocných s MM a ML po TKB. Data byla získána v průběhu roku 2004/2005 od 56 respondentů (32 s MM: 18 mužů, 14 žen, 24 s ML: 11 mužů, 13 žen) léčených TKB na OKH II. interní kliniky FN Hradec Králové. Věkový medián u nemocných s MM byl 60 let, u nemocných s ML 46,5 roku. Hodnocení kvality života bylo provedeno českou verzí mezinárodního generického dotazníku kvality života European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D. Výsledky prezentují statisticky významnou závislost kvality života na věku u obou kohort nemocných. S přibývajícím věkem koreluje nižší úroveň kvality života. Nižší úroveň kvality života byla prokázána u kuřáků v kohortě nemocných s MM. Vliv ostatních aspektů na kvalitu života se prokázal jako statisticky nevýznamný. Celková kvalita života nemocných s MM v porovnání s nemocnými s ML léčenými TKB je na nižší úrovni. Dominujícími obtížemi u nemocných s MM byla obvyklá činnost s obtížemi (u 81,2 %), středně závažná bolest (u 68,8 %), pohyblivost s obtížemi (u 59 %) a středně závažná úzkost či deprese (u 59 %).