

Vliv kouření na onemocnění dutiny ústní

Influence of Smoking on Oral Health

Šmejkalová J¹, Čermáková E², Hodačová L³,

Vellappally S¹, Vimal J¹, Slezák R⁴

¹Ústav hygieny a preventivního lékařství,

²Oddělení výpočetní techniky a

³Ústav sociálního lékařství, LF UK v Hradci Králové

⁴Stomatologická klinika FN, Hradec Králové

Byla provedena průřezová studie zaměřená na zjištění vlivu kouření na onemocnění dutiny ústní u dospělé populace. Studie měla 2 části – dotazníkovou a klinickou, která spočívala v posouzení stavu sliznic, chrupu (KPE index) a parodontu (CPITN index). Soubor tvoří 679 osob – 287 s pozitivní a 392 s negativní kuřáckou anamnézou. Studie ukázala, že nekuřáci mají vyšší vzdělání, lepší přístup k orálnímu zdraví a častěji chodí na preventivní prohlídky. Klinické vyšetření prokázalo horší stav chrupu kuřáků (vyšší počet chybějících zubů a nižší počet zubů s výplní) a horší stav parodontu – častější výskyt parodontálních chobotů (CPITN 3 a 4). Dosažené výsledky dokazují význam/nezbytnost provádění důsledné protikuřácké intervence zubními lékaři.

Studie vznikla s podporou grantu IGA MZ ČR č. NR8781-3/06.