

VLIV PIERCINGU NA ORÁLNÍ ZDRAVÍ

Piercing doznal u dospívajících a mladých lidí v posledním desetiletí velké obliby a mezi nejčastější místa aplikace patří jazyk. Používané „šperky“ však mohou poškozovat zuby a periodont a vytvářet ideální prostředí pro mikroorganismy. Článek stomatologů z University v Goettingen (Německo) informuje o výsledcích zkoumání, zda a kolik periodontopatických mikroorganismů lze nalézt na jazyku v místě piercingu. Soubor tvořili pacienti s piercingem, kteří navštívili stomatologické pracoviště a byli ochotni zúčastnit se studie. Dotazníkem bylo zjištěno, z jakého materiálu je piercing, kdy byl aplikován (pacienti měli piercing 2–8 let), jakou pozornost věnuje respondent ústní hygieně a zda kouří.

Z povrchu aplikovaných předmětů v místě přiléhajícím k perforaci jazyka byly odebrány vzorky na mikrobiologické vyšetření a analyzovány na přítomnost 11 kmenů periodontopatických bakterií. U všech vyšetřených byl zjištěn jejich zvýšený nebo podstatně zvýšený počet. Čím déle byl piercing v ústech, tím výraznější byl vzestup, od mírného periodontopatického potenciálu k vysokému. Autoři konstatují, že piercing představuje potenciální rezervoár periodontopatických bakterií.

Ziebolz D, Hornecker E, Mausberg RF. Microbiological findings at tongue piercing sites: implications to oral health. Int J Dent Hyg. 2009 Nov;7(4):256-62.

Redakce