

NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY JAKO UKAZATEL HYGIENICKÉ ÚROVNĚ

Studie odborníků z bonnského Institutu hygieny a veřejného zdravotnictví se zaměřila na využitelnost opakovaných šetření prevalence jako nástroje surveilance infekcí se vztahem ke zdravotní péči v ošetrovatelských domech.

Od prosince 2006 do září 2007 se uskutečnilo ve 4 ošetrovatelských domech po 5 prevalenčních šetřeních a týkalo se celkem 2369 obyvatel. Na počátku byly v ošetrovatelských domech zhodnoceny strukturální a procedurální parametry hygienické kvality na základě inspekce a seznamu 40 ukazatelů. Výsledky prokázaly vysokou úroveň hygienické kvality, průměrně bylo splněno 84 % parametrů s rozmezím 75–93 %. Prevalence infekcí se vztahem ke zdravotní péči byla celkově 6,8 % se znatelným vzestupem u vyšších kategorií nesoběstatečnosti (závislosti) obyvatel (3,5 %, 4,0 %, 8,5 % a 12,3 % u kategorií závislosti 0, I., II., III. a IV.). Nejvyšší prevalenci měly re-

spirační infekce (4,1 %), infekce kůže a měkkých tkání (1,5 %) a infekce močového ústrojí. Respirační infekce měly sezonní výkyvy, ataka v jednom domě způsobila vzestup na 17 %.

Autoři konstatují, že opakovaná šetření infekcí se vztahem ke zdravotní péči se snadno dají použít jako ukazatel kvality péče v ošetrovatelských domech. Upozorňují, že výsledky je třeba korigovat (standardizovat) s ohledem na zastoupení různě závislých obyvatel.

Engelhart S, Lauer A, Simon A, Exner D, Heudorf U, Exner M. Repeated prevalence investigations of nursing home-associated infections as a tool to assess the hygienic quality of care. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2009 Oct;52(10):936-44. (In German.)

Jaroslav Kríž