

Česká republika je zemí, kde výskyt zhoubných nádorů patří k nejvyšším v Evropě i ve světě. Hrubá incidence, včetně non-melanové rakoviny kůže, dosáhla v roce 2007 736 případů na 100 tisíc mužů a 648 případů na 100 tisíc žen; mortalita byla 236 úmrtí na 100 tisíc obyvatel. Každý rok zemře na zhoubný nádor přes 27 tisíc lidí. Za poslední desetiletí (1997–2007) stoupla celková incidence malignit o 26,4 %, přičemž mortalita se v podstatě stabilizovala, resp. došlo k mírnému poklesu o 2,5 %. Silně vzrostla prevalence a v roce 2007 překročila 400 tisíc případů. Mnohočetné primární nádory činily 11 % z celkové incidence.

Nejčastější diagnózou byla kolorektální rakovina, rakovina plic, prsu a prostaty. Obecně se dá konstatovat,

že časná diagnostika je v ČR stále nedostatečná, přestože se u některých diagnóz zvýšil podíl časných stadií, např. u rakoviny prsu žen a u kožního melanomu.

Výtečná úroveň sběru a zpracování dat je důležitá pro stanovení priorit a bezpochyby povede ke snížení pozdě diagnostikovaných případů a snížení výrazných regionálních diferencí v efektivitě diagnostiky.

*Dušek L, Mužík J, Gelnarová E, Fínek J, Vyzula R, Abrahamová J. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klin Onkol. 2010;23(5):311-24.*

*Jaroslav Kríž*