

PODÍL TABÁKU NA ÚMRTÍCH VE VÝCHODNÍ EVROPĚ

Prevalence úmrtí způsobených tabákem ve východoevropských zemích patří mezi nejvyšší ve světě. Dosavadní údaje vycházely většinou z nepřímých dat a studie autorů z londýnských univerzitních ústavů se proto zaměřila na přímé populační šetření v Rusku, Bělorusku a Maďarsku. Populační atributivní rizikové frakce byly zjištěny na souborech více než 77 tisíc žen a více než 99 tisíc mužů ve věku 40–79 let na základě prevalence kouření a poměru mortality u kuřáků oproti nekuřákům. Trendy byl posouzeny v časových obdobích 1982–1989, 1990–1997, 1998–2005 a 2006–2013.

V posledním období 2006–2014 byl podíl úmrtí, které lze u mužů přičíst tabáku 23 % v Rusku, 22 % v Bělorusku a 22 % v Maďarsku. U žen byly tyto podíly 2 %, 2 % a 13 %. Podíly úmrtí z tabáku od začátku 90. let u mužů mírně klesaly, u žen stoupaly.

Stefler D, Murphy M, Irdam D, Horvat P, Jarvis M, King L, et al. Smoking and mortality in Eastern Europe: results from the PrivMort retrospective cohort study of 177,376 individuals. Nicotine Tob Res. 2017 Jun 1. doi: 10.1093/ntr/ntx122.

Redakce